



CONSENSO INFORMATO TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA

IO MEDICAL STP RL – DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO

Paziente: _____ nata a _____ il _____

Il paziente conferma di essere stato informato in data ____/____/____ dal dott. Leonardo M. Ioppolo:

La Tossina Botulinica di Tipo A è indicata per il temporaneo miglioramento delle rughe gabellarli, di grado da moderato a grave, tra le sopracciglia al corrugamento, le rughe periorculari laterali (zampe di gallina) e rughe frontali, quando la gravità di tali rughe ha un importante impatto psicologico per il paziente.

Pazienti con asimmetrie facciali congenite o acquisite (paresi a frigore e post ictali) possono avere beneficio dal trattamento con tossina botulinica. Inoltre, può essere utilizzata per trattare i casi di iperidrosi (eccessiva sudorazione) a livello delle mani/piedi/ ascelle e volto.

In molti pazienti con emicrania l'utilizzo della tossina a livello della regione corrugatoria ha un effetto di riduzione della frequenza e intensità delle crisi emicraniche.

La procedura di inoculo può provocare dolore/bruciore/prurito/, edema e/o in associazione con l'iniezione. A volte si possono creare delle ecchimosi nella zona di iniezione in genere facilmente trattate con creme coprenti per qualche giorno.

Le reazioni avverse più comuni associate all'utilizzo della Tossina Botulinica di Tipo A sono, mal di testa, ptosi (abbassamento della palpebra superiore), eritema, debolezza muscolare localizzata e dolore facciale.

Le reazioni avverse, se dovessero avvenire, hanno luogo nei giorni immediatamente successivi all'iniezione e sono in genere transitorie e di gravità lieve o moderata.

Come nel caso di qualsiasi altro farmaco, la Tossina Botulinica di Tipo A può causare reazioni avverse: in questo caso informare il medico immediatamente.

Per almeno 24 ore dopo il trattamento la paziente deve evitare di massaggiare le zone trattate.

Data l'impossibilità di prevedere in maniera perfetta la diffusione della tossina, potrebbero manifestarsi delle asimmetrie a riposo o durante i movimenti mimici, asimmetrie spesso trattate con una infiltrazione aggiuntiva dopo circa 2 settimane dalla prima.

In caso di gravidanza certa o presunta e allattamento informare il medico prima di effettuare il trattamento.

La Tossina Botulinica di Tipo A è controindicata: in soggetti con ipersensibilità accertata alla tossina botulinica di tipo A o ad uno qualsiasi degli eccipienti della formulazione; in presenza di miastenia grave o della Sindrome di Eaton Lambert; in presenza di infezione ai siti di inoculo da trattare.

Molto raramente sono state riportate reazioni avverse legate alla tossina botulinica forse connesse alla diffusione del farmaco distante dal sito di somministrazione.

Un dosaggio eccessivo o troppo frequente può aumentare il rischio di formazione di anticorpi nel sangue che può causare l'insuccesso del trattamento con tossina botulinica di tipo A anche per altre indicazioni.

L'effetto estetico della Tossina Botulinica di Tipo A dura in media 3-4 mesi ma può variare secondo lo stato della pelle, della zona trattata, della quantità di prodotto iniettato, dalla tecnica di inoculo e da fattori legati allo stile di vita quali l'esposizione al sole e il fumo. Un eventuale durata inferiore, soprattutto in pazienti che hanno effettuato numerosi trattamenti con tossina botulinica, potrebbe essere legata a un riconoscimento della tossina da parte del sistema immunitario. Questo implica impossibilità di ripetere trattamento in immediato, dopo attesa di 5 mesi sarà possibile ripetere trattamento (che resta a totale carico del paziente).

In caso di trattamento di asimmetrie facciali complesse è da tenere in conto l'impossibilità di raggiungere una perfetta simmetria tra i due emivolti, ma solo un miglioramento. L'entità del risultato (che sarà proporzionato sia alla qualità dei tessuti che alla conformazione e alle condizioni antecedenti all'intervento).

Dopo il trattamento, si consiglia di evitare espressioni del viso eccessive, di consumare alcol e di applicare trucco per 12 ore.

Si prega inoltre di evitare l'esposizione eccessiva al sole, ai raggi UV, a temperature molto fredde e a saune per 2 settimane dopo il trattamento. L'entità del risultato (che sarà proporzionato sia alla qualità dei tessuti che alla conformazione e alle condizioni antecedenti all'intervento) potrebbe non essere quello atteso dalla paziente concordato durante le visite precedenti.

Confermo che il dott. Leonardo M. Ioppolo ha:

- Fornito informazioni sufficienti per capire l'utilizzo di cui sopra al fine di poter prendere una decisione informata;
- Dato l'opportunità di rivolgere altre eventuali domande sul trattamento proposto e sono soddisfatta delle risposte ottenute; lasciato il tempo di pensare al trattamento sopra descritto; ricevuto le informazioni che si riferiscono alla mia storia clinica per quanto io ne sia a conoscenza.

Acconsento pertanto a sottopormi al trattamento con tossina Botulinica

Confermo di non essere in gravidanza

FIRMA PAZIENTE

Dr. Leonardo M. Ioppolo
OMCEO RC 9709